

Standard diagnostyki

Centrum Psychoneurologii Sue Ryder

Działalność Centrum Psychoneurologii Sue Ryder skierowana jest do pacjentów z **zaburzeniami psychicznymi** charakterystycznymi dla **wieku podeszłego**, w szczególności pacjentów z **otępieniem (demencją)**.

Cele oddziaływania na pacjenta i jego Środowisko:

- utrzymanie pacjenta w sprawności psychofizycznej
- poprawa tej aktywności z podjęciem działań farmakologicznych i pozafarmakologicznych
- aktywizacja społeczna pacjenta i opiekuna oraz ograniczanie stygmatyzacji i izolacji związanych z zaburzeniami psychicznymi
- pomoc udzielona opiekunowi w realizacji powyższych celów
- poprawa sytuacji środowiskowej pacjenta poprzez edukację i współpracę z opiekunami pacjenta
- podjęcie kroków zmieniających sytuację socjalną pacjenta w razie niemożności współpracy w jego obecnym środowisku

PROCES DIAGNOSTYCZNY (prowadzony ambulatoryjnie)

składa się z następujących elementów:

1. USTALENIE ROZPOZNANIA

konieczne zaraz po przyjęciu pacjenta do opieki.

Rozpoznanie ustalane jest na podstawie wytycznych IGERO oraz według obowiązujących klasyfikacji schorzeń.

Proces ustalania rozpoznania obejmuje:

- lekarskie porady diagnostyczne,
- badania neuropsychologiczne,
- społeczną ocenę funkcjonowania,
- badania dodatkowe, w tym neuroobrazowe.



2. WERYFIKACJA ROZPOZNANIA

przeprowadzana na bieżąco w razie zaistnienia wątpliwości lub progresji choroby

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO

- Jednostki ambulatoryjne ośrodka należy traktować jako **jednostki konsultacyjne**
- Każdy pacjent pozostaje pod opieką **stałego** lekarza prowadzącego
- Kontrolne porady lekarskie powinny mieć miejsce zgodnie z **realnymi potrzebami** pacjenta i opiekuna
- W **sytuacjach kryzysowych** istnieje możliwość kontaktu z rejestracją ośrodka celem uzyskania **porady nieplanowanej**
- Leczenie farmakologiczne stosowane jest zgodnie z obowiązującą **wiedzą medyczną, zaleceniami ekspertów** oraz **przepisami refundacyjnymi**
- **Unikamy** polipragmazji (przyjmowania wielu leków jednocześnie) i stosowania leków o nieudowodnionym działaniu